

MANIOBRA DE HEIMLICH

PONENTE: DR. HERNÁN DARÍO
SÁNCHEZ RAMOS
MÉDICO FISIATRA


EPIDEMIOLOGÍA

- La asfixia es bastante común. La muerte por asfixia ocurre con mayor frecuencia en niños menores de tres años de edad y en personas ancianas, pero se puede producir a cualquier edad.

- La maniobra de Heimlich ha sido valiosa para salvar vidas y puede ser aplicada por cualquier persona que haya aprendido la técnica.




PORQUE



DEFINICIÓN





ADVERTENCIA: No use esta maniobra a menos que esté seguro de que la persona se está atragantando.



Maniobra de Heimlich en niño menor de 1 año

Pasar el dedo por la boca del niño o lactante para retirar los restos



Maniobra de Heimlich en lactantes

Colocar al lactante boca abajo sobre el antebrazo y dar cinco golpecitos en la espalda de éste con la parte carnosa de la mano



Maniobra de Heimlich en niños conscientes



Maniobra de Heimlich en el adulto

Colocar un puño sobre el ombligo del individuo con el lado del pulgar hacia el abdomen



EN VICTIMAS INCONSCIENTES



EN OBESOS

58

Part 3: Adult Basic



Fig. 26. Healthcare provider provision of subdiaphragmatic abdominal thrust (Heimlich maneuver) in unresponsive/unconscious victim.



iiiiiiGRACIAS!!!!!!!

- PAN PARA SU MATATE